



Estudio con Pacientes de Leucemia mieloide Crónica en Colombia

La leucemia representa el **20%** de todos los diagnósticos oncológicos

La LMC representa entre un **15% a 20%** de todas las leucemias

Su incidencia es de **1.5** casos por cada **100.000** personas cada año

165 Pacientes fueron vinculados al estudio de investigación

con edades entre **18 - 86 años**

92 Mujeres **73** Hombres

Todos ellos reciben tratamiento en **13 ciudades** y **1 municipio** del país



Afiliación en salud: **113** Régimen contributivo, **52** Régimen subsidiado

Itinerario del proceso diagnóstico del paciente con LMC



Consultas al médico

- 49% de los pacientes consultó en **máximo 1 mes**
- 21% consultó entre **2 y 6 meses**
- 4% consultó **luego de 6 meses**
- 26% **NO consultó**

Síntomas

30% (49) pacientes Llegó al dx de manera incidental

19% (31) pacientes NO presentó síntomas



25% (42) Pacientes



recibió diagnósticos **erróneos**



Remisión al Hematólogo

R. contributivo 33%
R. subsidiado 23%

30%
fue remitido
inmediatamente

22%
En 1 a 2
semanas

23% R. contributivo
19% R. subsidiado

R. contributivo 23%
R. subsidiado 16%

20%
+ 2 meses
+ 6 meses

28%
En 3 a 4
semanas

21% R. contributivo
42% R. subsidiado

Los pacientes del R. subsidiado tardan más tiempo en acceder al especialista Hematólogo



Inicio tratamiento

69%
accedió
inmediatamente

70.8% R. contributivo
63% R. subsidiado

17%
entre 1 semana
y 1 mes

18,6% R. contributivo
16% R. subsidiado

14%
más de
1 mes

10,6% R. contributivo
21% R. subsidiado

Los pacientes del R. Contributivo accedieron con mayor oportunidad al inicio de su tratamiento



Diagnóstico final

Tiempo para recibir el diagnóstico desde la presentación de los síntomas

31%
(51) pacientes
accedió al dx en máximo 1
mes posterior a la
presentación de los síntomas

44%
(72) pacientes
entre 2 y 6 meses

25%
(42) pacientes
más de 6 meses



Acceso a medicamentos

62%
(102) pacientes

suspendieron medicamento por razones no médicas
La principal causa descrita fue la demora en la entrega del medicamento por parte de la farmacia

103
(62%) pacientes



refirieron haber perdido respuesta al medicamento en algún momento

De ellos, el 18% lo atribuyó justamente a la falta de medicamento

11%
R. contributivo



32%
R. subsidiado

79%
R. contributivo



91%
R. subsidiado

51% refirió haber suspendido el tratamiento 1 o 2 veces desde que inició tratamiento

35% entre 3 y 4 veces

14% más de 5 veces

El 65% del R. subsidiado



reportó haber recibido 8/8 cajas

para 8 meses de tratamiento Vs el 80,5% del R. contributivo



Preocupa que el 14% del R. subsidiado y el 8% del R. contributivo solamente hayan recibido 5/8, 4/8, 3/8 y hasta menos de 3 cajas de medicamento para su tratamiento durante 8 meses



Tiempos de entrega de medicamentos por MIPRES o CTC

27,6%
del régimen
contributivo



15%
en el régimen
subsidiado

accedió inmediatamente a su medicamento

40,8%
del régimen
contributivo



37,5%
en el régimen
subsidiado

Lo recibió en 1 a 2 semanas

Son más los pacientes
del R. subsidiado



del R. contributivo

20%

14,5%



Quienes padecen demoras mayores a 3 semanas,
para la entrega de sus medicamentos



Acciones legales

63% de los pacientes
manifestó haber instaurado
una acción de tutela

55% R. contributivo

Vs

81% R. subsidiado



Otras barreras de acceso



Cambio de IPS

46% reportó cambios de IPS
(76) pacientes por orden de su asegurador

38% R. contributivo

Vs

63% R. subsidiado



El **27%** de los pacientes consultados consideró la
demora en la entrega de medicamentos, como el
principal problema como paciente de LMC en Colombia

19%
R. contributivo



44%
R. subsidiado



Fundación Colombiana de
leucemia y linfoma

•Inspiradores de vida•

Estudio de investigación desarrollado por
Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma
Noviembre de 2018

Diseño y diagramación - Lina Daniela Acosta